OCT 3 0 1929

EN VENTE CHEZ L'AUTEUR
(Prix du présent fascicule : 3 fr. 50)

M2,896

MÉLANGES EXOTICO-ENTOMOLOGIQUES

LIBRARY
MUS. COMP. ZOÖLOGY
CAMBRIDGE, MASS.

DIX-SEPTIÈME FASCICULE

(25 février 1916)

PAR

MAURICE PIC

OFFICIER D'INSTRUCTION PUBLIQUE
CHEVALIER DU MÉRITE AGRICOLE
DIRECTEUR DE L'« ÉCHANGE »
CORRESPONDANT DU MUSÉUM DE PARIS
MEMBRE DE NOMBREUSES SOCIÉTÉS SCIENTIFIQUES
DE FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

MOULINS
IMPRIMERIE ÉTIENNE AUCLAIRE
ANCIENNE MAISON C. DESROSIERS
1916

Tous droits réservés

LIBRARY
MUS. COMP. ZOÖLOGY,
CAMBRIDGE, MASS.

INTRODUCTION

J'aurais voulu publier la liste des nouveautés (rédigée in litteris) décrites dans les 8 derniers fascicules (comme je l'ai déjà fait pour les huit premiers), ce qui aurait pu permettre la réunion en volume de ces divers fascicules, mais, la reliure pourra être faite sans cette table. Les fascicules de cette publication, paraissant à dates irrégulières, peuvent être groupés sans inconvénient de diverses façons, réunis, ou séparés, au gré des amateurs et c'est là une question secondaire. La question plus importante, et qui a dirigé ma plume, est que les frais d'impression, le prix du papier ont notablement augmenté ces derniers temps, d'où nécessité d'aller au plus urgent : la publication des nouveautés.

Je me contente de donner ici quelques indications générales sur le contenu des fascicules IX à XVI. Dans ces fascicules sont décrits 24 genres et sous-genres, 450 espèces et 71 variétés, c'est assez dire l'importance de leur contenu et suffisamment indiquer la nécessité, pour les descripteurs tout au moins, de ne pas les ignorer. Dans les neuf premiers fascicules figurent 15 genres ou sous-genres nouveaux, 291 espèces et 53 variétés nouvelles, ce qui donne aujourd'hui comme ensemble de nouveautés le total respectable de 39 genres ou sous-genres, 741 espèces et 124 variétés ; à trois ou quatre exceptions près, les *types* des nouveautés sont dans ma collection.

Les plus récents fascicules contiennent des *Clavicornes, Ptinides* et *Anobiides, Dascillides, Malacodermes, Hétéromères, Bruchides, Curculionides, Longicornes* et *Phytophages*. Toutes les nouveautés décrites dans le présent fascicule figurent dans la coll. Pic.

NOTES ET DESCRIPTIONS ABRÉGÉES DIVERSES

Stenotelmus nigrosparsus v. nov. madurensis. Thorace pallido, in disco nigro trimaculato, elytris multi et sat dense nigro maculatis, maculis pro parte junctis. Indes : Madura.

Macrosilis Fortunei v. nov. longior. A typo differt antennis ad basin late testaceis, elytris minus brevioribus. Tonkin.

Attagenus s. g. nov. Pseudotelopes. Coxis anticis validis et prominulis, pedibus brevibus, deplanatis ; thorace lateraliter et infra concavo ; capite libero ; clava, antennarum satis brevis et triarticulata.

Ce nouveau sous-genre, voisin de Telopes Redt., est caractérisé conjointement par la structure de ses pattes et celle de ses antennes dont la massue est médiocre, composée de 3 articles, le dernier étant un peu plus long.

Pseudotelopes Simoni n. sp. Oblongus, postice attenuatus, nitidus, rufescens, capite et infra corpore nigris, luteo aut griseo pubescens, in elytris multi et irregulariter griseo fasciolatis. Long. 4 mill. Manille (E. Simon).

Pseudotelopes madecassus n. sp. Subovatus, postice attenuatus, nitidus, rufescens, luteo sat sparse pubescens, elytris irregulariter et parum distincte fasciatis aut maculatis. Long. 4 mill. Madagascar : Annanarive (Sikora).

Ressemble au précédent, mais tête et dessous de le coloration du dessus et mouchetures des élytres moins nettes.

Pseudotelopes testaceipes n. sp. Oblongus, postice attenuatus, luteo aut griseo pubescens, nitidus, nigro-piceus, thorace lateraliter elytrisque apice rufescentibus, his albo multi maculatis aut subfasciatis, pedibus testaceis. Long.

3 mill. Tonkin : Hanoi. — Plus nettement atténué en arrière et plus foncé que les précédents.

Phradonomorphus n. g. Coxis anticis minutis ; thorace lateraliter infra valde excavato ; antennis brevibus, articulo ultimo valido et maximo, triangulare.

Ce nouveau genre, très voisin de *Thaumaglossa* Redt. par sa structure antennaire, s'en distingue par la forme très large et triangulaire du dernier article de ces organes. Il est établi pour l'espèce *rufofasciata* Pic décrite dans un précédent fascicule et placée, à tort dans le genre *Æthriostoma* Mots.

Le *Thaumaglossa testaceipes* Pic, précédemment décrit dans cette publication, doit se classer dans le genre *Orphinus* Mots. et *Æthriostoma atricolor* Pic doit être placé plutôt dans le genre *Thaumaglossa* Redt.

L'an dernier, j'ai décrit dans l'*Echange* (N^os^ 368 à 371), de nombreuses formes nouvelles de *Scaphidiidæ* ; j'attire ici particulièrement l'attention sur la tribu nouvelle des *Cerambyciscaphini* (lege *Cerambyscaphini*), remarquable par la structure de ses antennes et leur mode d'insertion sur la tête.

Scaphosoma s. g. nov. Scutoscaphosoma. Scutello minutissimo sed distincto ; elytris multi et profunde punctatis.

Ce nouveau sous genre, peut-être susceptible d'être érigé en genre propre, sera caractérisé et distinct par deux caractères ; l'écusson visible quoique très petit et les élytres profondément ponctués.

Scutoscaphosoma Rouyeri n. sp. Oblongus, antice et postice subattenuatus, nigro-piceus, capite rufescente, antennis pro majore parte pedibusque testaceis ; elytris nigris, ad basin in disco brunnescentibus et ad apicem testaceo fasciatis. Long. 2,5 mill. Java (Rouyer). — Cette espèce a le prothorax finement et éparsément ponctué, tandis que la ponctuation élytrale est très profonde (sauf au

sommet), en partie disposée en rangées, la strie suturale ne se recourbe pas sur la base des élytres.

Scaphosoma oblongum n. sp. Oblongo-ovatus, niger, elytris plus minusve brunnescentibus, capite antice, antennis, pedibus abdomineque testaceis ; elytris sat fortiter et sparse punctatis. Variat : elytris brevioribus, fortiter punctatis **var. nov punctatipenne**. Long. 2 mill. Ile Nias. — Diffère de *Ps. punctatum* Pic, en outre de la strie suturale presque droite, par la ponctuation plus irrégulière des élytres et ceux-ci dépourvus de macule apicale claire. La variété *punctatipenne*, de Bornéo, se distingue par la forme non oblongue des élytres et leur ponctuation plus forte.

Falsocossyphus n.g. Corpore oblongo, subconvexo, alato ; capite subter thorace collocato, antice prolongato ; antennis 11 articulatis, compressis, apice attenuatis ; thorace lateraliter supra sulcato ; pedibus brevibus, femoribus deplanatis, postice incisis ; coxis anticis subglobosis, approximatis, posticis parum distantibus.

Genre très caractérisé par la tête cachée et enchassée en dessous du prothorax qui est muni d'un sillon latéral éloigné des bords, par les antennes à articles comprimés et rétrécies au sommet, les cuisses aplaties, incisées en arrière pour recevoir les tibias. Je ne sais pas au juste où placer ce curieux genre qui, avec une tête encapuchonnée comme *Cossiphus* Ol., ressemble un peu à un *Oochrotus* Luc. géant, de forme plus allongée mais avec des caractères propres très distincts. Ce nouveau genre pourrait peut-être former une tribu nouvelle près des *Cossiphides*.

Falsocossyphus pilosus n. sp. Oblongus, subparallelus, nitidus, luteo sat sparse pilosus et asperato-punctatus, rufo-testaceus ; elytris substriatis. Long. 5 mill. Calcutta (1).

Spastica zonata v. nov. diversipennis. Elytris

(1). Décrit sur un unique exemplaire. Très vraisemblablement l'espèce est myrmecophile.

nigris, ad medium et lateraliter late testaceo notatis, thorace testaceo. Brésil.

Formicomus imperator v. nov. ruficolor. Rufo-testaceus ; capite sat sparse punctato. Manille.

Leptura (Strangalia) semiannulata n. sp. Fere opacus, parum elongatus, postice attenuatus, niger, elytris albido trifasciatis, infra corpore pro parte aureo pubescens.

Presque opaque, peu allongé, attenué postérieurement, noir avec les élytres ornés de trois fascies blanchâtres, la première basale, en forme de demi anneau ouvert extérieurement, les deux autres transversales, placées en dessous du milieu et avant le sommet. Tête assez grosse ; antennes n'atteignant pas le sommet des élytres ; prothorax plus long que large, un peu rétréci en avant, densément ponctué, orné d'une bande pubescente sur sa base ; élytres un peu plus larges que le prothorax, assez courts, atténués postérieurement et un peu déhiscents au sommet ; pattes moyennes, les postérieures plus longues ; dessous du corps en partie revêtu de poils dorés. Long. 10 mill. Assam. — Cette espèce, à dessins élytraux particuliers, peut se placer provisoirement près de *L. Guerryi* Pic.

Olenecamptus albolineatus n. sp. Elongatus, niger, elytris rufescentibus, antennis pedibusque pro parte rufis, supra et infra corpore albo notatis.

Allongé, noir avec les élytres roussâtres, antennes et partie des pattes rousses, dessus et dessous ornés de lignes, ou macules, blanches. Tête à lignes blanches sinuées, une de chaque côté derrière les yeux, et prolongées sur le prothorax, celui-ci long, faiblement plissé transversalement au milieu ; élytres nettement plus larges que le prothorax, un peu élargis en dessous du milieu et rétrécis à l'extrémité, ornés sur chacun des dessins blancs suivants : une bande un peu interrompue latérale, une autre présuturale, celles-ci longues, une 3e raccourcie au milieu, trois macules allongées discales dont la postérieure étroite, l'antérieure vers le milieu, enfin une petite macule allongée présuturale

et rapprochée de l'extrémité ; tibias antérieurs un peu coudés vers le sommet. Long. 15 mill. Cochinchine. — Cette espèce, très distincte par la disposition des dessins blancs des élytres, peut prendre place près de *C. compressipes* Frm.

Olenecamptus borneensis n. sp. Parum elongatus, paulum nitidus, rufus, infra obscurior et dense albo notatus, elytris albo trinotatis.

Peu allongé, faiblement brillant, roux, plus foncé en dessous, revêtu en dessous d'une pubescence blanche presque continue avec quelques petites macules glabres sur l'abdomen, en dessus de pubescence jaunâtre pas très serrée avec les élytres ornés chacun de trois macules blanches : une grosse subarrondie commune derrière l'écusson, une autre grosse discale subarrondie, en dessous du milieu, une allongée externe, en dessous des épaules. Tête pas très longue et grosse ; prothorax plus long que large, étranglé en arrière, nettement plissé au milieu, brièvement maculé de blanc de chaque côté sur sa base ; élytres un peu plns larges et relativement courts, subacuminés au sommet ; pattes longues, tibias antérieurs denticulés. Long. 20 mill. Bornéo. — Voisin de *O bilobus* F. avec des macules élytrales différentes.

Olenecamptus Rouyeri n. sp. Satis élongatus, paulum nitidus, rufus, aliquot pro parte obscurior, infra sat dense albo pubescens, elytris luteo aut albo trinotatis.

Assez allongé, peu brillant, roux, parfois plus foncé par places, dessous assez densément pubescent de blanc, dessus médiocrement pubescent de gris jaunâtre avec les élytres ornés d'une grosse macule postscutellaire commune jaune, d'une petite macule blanche discale, mais un peu latérale, en dessous de la première, enfin d'une macule allongée basale externe, ces deux dernières blanches. Long. 11-15 mill. Java (Rouyer). — Voisin du précédent, moins large et plus atténué postérieurement, avec les macules des élytres autrement disposées.

Chreonoma pallidicolor n. sp. Parum elongatus,

pallido-testaceus, oculis nigris, antennis apice médiocre infuscatis.

Peu allongé entièrement testacé pâle, moins les yeux noirs, avec le sommet des antennes brièvement obscurci. Tête sillonnée ; antennes un peu moins longues que le corps ; prothorax court, assez largement tuberculé sur les côtés, médiocrement impressionné en arrière, à ponctuation forte et espacée sur le disque, élytres nettement plus larges que le prothorax, subparallèles, à ponctuation forte et écartée, s'effaçant postérieurement surtout vers la suture. Long. 11 mill. Cochinchine ; Saïgon. — Peut se placer près de *Ch. pallida* Thoms.

Oberea subannulicornis n sp. Parum elongatus, nitidus, testaceus, scutello, infra corpore, pedibus antennisque pro parte nigris.

Peu allongé, brillant, testacé, écusson, dessous du corps et partie des membres noirs, arête externe des élytres noire. Tête un peu plus large que le prothorax celui-ci court ; antennes peu plus longues que le corps, noires à la base, rousses ensuite, avec le sommet des articles foncé ; élytres un peu plus larges que le prothorax, pas très longs, atténués postérieurement, à rangées de points forts. Long. 11 mill. Himalaya. — Peut se placer prés de *O marginella* Bates, sa forme est moins allongée et la coloration différente.

Leucastea nigromaculata n. sp. Rubro-testaceus, oculis, antennis, articulo primo excepto, tibiis apice tarsisque nigris, elytris ad medium et apice nigro maculatis.

De forme allongée, orné de poils dressés épars, fortement et éparsément ponctué sur l'avant-corps, plus fortement et moins éparsément sur les élytres. Long. 9 mill. Oubangui — Voisin de *L. Anceyi* Pic, prothorax plus arrondi sur les côtés, tibias testacés à la base et macule médiane des élytres moins allongée.

Leucastea benitensis n. sp. Rubro-testaceus, oculis antennisque nigris, infra corpore pedibusque nigro maculatis.

Peu allongé, orné de poils dressés épars, éparsément ponctué en avant, densément sur les élytres, de coloration générale testacé-rougeâtre avec quelques macules noires sur les côtés antérieures en dessous du corps ; les pattes testacées sont maculées de noir en dessous des cuisses ou au sommet, au milieu et au sommet des tibias. Long. 10 mill. Guinée : Benito. — Voisin de *L. Donckieri*, moins trapu, élytres plus densément ponctués et coloration des pattes différente.

Poecilomorpha testaceipes n. sp. Testaceus, elytris in disco brunnescentibus, antennis apice oculisque nigris.

Espèce de forme trapue, ornée de poils courts, en partie dressés, fortement ponctuée, plus éparsément sur l'avant-corps, élytres ayant des reflets irisés. Long. 7 mill. Afrique. Peut se placer près de *P. Passerrini* Hope.

Diagnoses Spécifiques [1]

Sandalus nigripennis n. sp. ♀ Elongatus, post medium parum dilatatus, subnitidus, mediocre pubescens, niger ; thorace breve, supra ad basin impresso ; scutello lato ; elytris subcostulatis, irregulariter et dense punctatis aut plicatis. Long. 16 mill. Chine : Yunnan. — Peut se placer près de *S. chinensis* Frm.

Sandalus atricolor n. sp. ♂ Elongatus, subparallelus, nitidus, griseo pubescens, niger, antennis apice testaceis ; thorace diverse punctato, snpra postice parum impresso ;

(1). Les présentes diagnoses sont publiées pour prendre date : bien que brèves, elles me paraissent suffisantes pour faire reconnaître les insectes auxquels elles se rapportent. Je reparlerai ultérieurement de certaines espèces, ou les décrirai plus longuement, si cela m'apparaît nécessaire.

scutello valido ; elytris subcostatis, irregulariter et dense punctatis aut plicatis. Long. 9 mill. Afrique : Moubasa. — Plus étroit, plus brillant que le précédent avec les antennes plus claires à leur sommet. Voisin de *S. subelongatus* Pic.

Callirrhipis Gounellei n. sp. ♂ Angustatus, subnitidus, griseo pubescens, pallido testaceus, capite pro parte, antennis pedibusque pro parte nigris, thorace in disco elytrisque apice breve nigro notatis, articulis 3 et sequentibus antennarum longe flabellatis ; thorace dense punctato ; elytris costulatis et punctato plicatis. Long. 14 mill. Brésil : Ceara (Gounelle). — Voisin de *C. Laportei* Hope.

Cantharis (Themus) inequalithorax n. sp. Major, elongatus, nitidus, supra niger, antice pro parte rufescente, scutello, antennis et infra corpore testaceis ; pedibus testaceis, femoribus apice tibiisque pro parte nigro-piceis ; capite grande ; thorace transverso, in disco multi impresso ; elytris satis latis et elongatis. Long. 22 mill. Indes. — Peut se placer près de *T. episcopalis* Ksw.

Cantharis multimaculata n. sp. Elongatus, satis angustatus, nitidus, griseo pubescens, capite in vertice uni, thorace in disco sex (3,3), nigro maculatis, abdomine nigro maculato, elytris nigris, ad basin testaceo notatis. Long. 14 mill. Indes. — Espèce très distincte par son système de coloration. A placer près de *C. vitellina* Ksw.

Cantharis latefulva n. sp. Minutus, parum elongatus, nitidus, niger capite antice, thorace elytrisque ad basin late testaceis ; thorace medio fossulato, breve brunnescente. Long. 5 mill. Pondichery. — Voisin de *C. semifulva* Gorh.

Cantharis infossulata n. sp. Minutus, paululum elongatus, nitidus, niger, capite, thorace, scutello, elytrisque rufo-testaceis. Long. 6 mill. Indes. — Voisin du précédent, coloration différente, prothorax plus large, faiblement impressionné au milieu.

Cantharis elongaticeps n. sp. Angustatus, nitidus, piceus, capite antice thoraceque lateraliter rufo-testaceis,

capite nigro, sparse pubescente, thorace elongato. Long. 7 mill. Tonkin : Bao-Lac. — Peut se placer près de *T. providus* Ksw.

? Discodon subaeneipenne n. sp. ♀ Elongatus, nitidus, testaceus, infra corpore pro parte tarsisque nigropiceis, capite postice brunnescente, elytris nigro-æneis ; thorace lato, marginato, lateraliter sinuato. Long. 8 mill. Calcutta. — Peut se placer près de *D. cæruleipenne* Pic.

Polemius lycoceriformis n. sp. Subparallelus, parum nitidus, niger, supra pro parte testaceus ; capite nigro, testaceo lineato ; thorace testaceo, ad medium nigro notato, breve, transverso, lateraliter subsinuato ; elytris testaceis, ad suturam vage subcyaneo lineatis, distincte costatis, lateraliter sinuatis. Long, 12 mill. Chine : Yunnan. — Espèce très distincte, ressemblant beaucoup à certains *Lycocerus* Gorh.

Silis peguensis n. sp. ♀ Elongatus, nitidus, elytris dense punctato-rugulosis et subopacis, niger, thorace scutelloque testaceis ; antennis deplanatis, subdentatis ; thorace antice arcuato, in disco sulcato, lateraliter subsinuato. Long. 7 mill. Indes : Pégu. — Voisin de *S. telephoroides* Pic.

Silis tonkineus n. sp. ♂ Elongatus, subparallelus, nitidus, niger, labro, thorace, femoribus tibiisque ad basin testaceis ; antennis satis gracilibus ; thorace subelongato, lateraliter ad medium valde inciso. Long. 5 mill. Tonkin. Peut se placer près de *S. sinensis* Pic.

Anthocomus trinotatus n. sp. Oblongus, postice dilatatus, nitidus, nigro-cyaneus, tarsis testaceis, elytris ad medium testaceo fasciatis, postice in singulo testaceo maculatis. Long. 3 mill. Madagascar. — A placer près de *A. humerosus* Ab.

Pseudocolotes testaceimembris n. sp. Ovatus, nitidus, niger, antennis et pedibus pro parte testaceis, femoribus ad basin nigris, elytris nigro-subviolaceis, apice trian-

gulariter testaceis. Long. 2 mill. Zanguebar. — Voisin de *P. apicalis* Pic.

Plesiophthalmus subparallelus n. sp. Elongatus, nitidus, niger, antennis apice piceis ; elytris thorace paulo latioribus, subparallelis, sat fortiter striato-punctatis, intervallis deplanatis, distincte punctatis. Long. 19 mill. Chine : Tien-Tsin. — Diffère de *P, lineipunctatus* Frm. par la coloration franchement noire, l'aspect très brillant, etc. Par sa forme presque parallèle diffère, d'autre part, de *P. nigrocyaneus* Mots.

Plesiophthalmus robustus n. sp. Grandis et latus, postice attenuatus, nitidissimus, nigro-subæneus, antice indistincte punctatis, elytris minute striato-punctatis. Long. 20-21 mill. Bornéo. — Peut se placer près de *P. amplipennis* Frm.

Notoxus Solarii n. sp. Elongatus, pro parte nitidus, griseo pubescens, testaceus, thorace subopaco, in disco piceo, cornu angustato, testaceo ; elytris apice subacuminatis, brunneo trinotatis, maculis anticis et intermediis ad suturam junctis. Long. 3 mill. Nicaragua (Solari). — Voisin de *N. eximius* Chp.

Formicomus barbarorum n. sp. ♀ Niger, elytris viridescentibus, ad basin bituberculatis et depressis, antennis coxisque testaceis ; capite postice obconico ; thorace postice depresso et bituberculato, Long. 5 mill. Afrique : Carmeroun. — Voisin de *F. tuberculithorax* Pic.

Formicomus leonensis n. sp. ♀ Niger, elytris viridescentibus, antennis testaceis, apice brunneis ; capite postice attenuato ; thorace in disco depresso, subsulcato ; elytris ad basin paulo depressis. Long. 4 mill. Sierra Leone. — Voisin de *F. Kraatzi* Pic.

Formicomus (Antelephilus) punctaticeps n. sp. Nigro-piceus, elytris ad basin thoraceque rufescentibus, pedibus testaceis, femoribus ad basin albidis, antennis testaceis ; capite lato, fortiter sat sparse punctato ; thorace

binodoso, antice canaliculato ; elytris ad medium albido fasciatis, apice truncatis, humeris nullis. Long. 4 mill. Himalaya. — Voisin de *A. cribriceps* Mars.

Spastica rufolineata n. sp. Elongatus, nitidus, fortiter plus minusve sparse punctatus, niger, thorace testaceo, pedibus pro parte rufescentibus, elytris nigro-piceis, in disco longitudinaliter rufo lineatis. Long. 7 mill. Brésil. — Voisin de *S. sphœrodera* Burm., mais moins densément ponctué avec chaque élytre orné d'une bande rousse présuturale, un peu oblique en avant.

Spastica tenuecincta n. sp. Parum elongatus, nitidus, antice fortiter et sparse punctatus, elytris punctato. rugulosis, niger, pro parte infra rufescente, thorace lateraliter rufo notato, elytris tenue testaceo marginatis. Long. 6 mill. Brésil. — A placer près de *S. maculicoltis* Klug.

Nemostira annulipes n, sp. Parum elongatus, subnitidus, longe griseo pilosus, rufo-testaceus, articulis 3-11 antennarum, femoribus ad medium nigris, epipleuris infra corpore tibiisque pro parte brunnescentibus ; elytris striato punctatis. Long. 6 mill. Sumatra. — Voisin de *N. atricolor* Pic.

Nemostira subelongata n. sp. Satis elongatus, nitidus, longe pilosus, rufo-testaceus, capite thoraceque pallidioribus, femoribus ad basin tibiis posticis apice testaceis, elytris striato-punctatis. Long. 10 mill. Sumatra — Peut se placer près de *N. Dohertyi* Pic.

Urodon capensis n. sp. Oblongus, parum nitidus, dense pupillato punctatus, sat sparse griseo pubescens, niger, antennis pedibusque rufescentibus. Long. 4 mill. Le Cap. — Voisin de *U. vermiculatus* Sch. et distinct, à première vue, par ses pattes rousses.

Urodon discoidalis n. sp. Elongatus, subparallelus, longe et dense griseo pubescens, niger, capite antice, abdomine, antennis pedibusque rufo-testaceis, elytris nigris, in

medio longitudinaliter rufo lineatis. Long. 3 mill. Le Cap. Voisin de *U. pelliceus* Fahr.

Urodon nigrofemoratus n. sp. Oblongus, parallelus, nitidus, dense punctatus, subtiliter et sparse griseo pubescens, niger, ore, antennis ad basin et tibiis anticis testacei . Long. 3 mill. Afrique Australe : Port Elisabeth. Voisin de *U. lilii* Fahr.

Xylographus testaceitarsis n. sp. Nitidus, glaber, niger tarsis testaceis, thorace antice sinuato, in mare medio truncato, alutaceo, fortiter sat sparse punctato ; elytris fortiter sat sparse punctatis. Long. 4 mill. Madagascar. — Voisin de *X. anthracinus* Mel., mais calus humeral non teinté de roux et ponctuation différente.

Xylographus nitidissimus n sp. Nitidissimus, glaber niger, antennis tarsisque rufo-testaceis : thorace antice sinuato, in mare medio truncato, alutaceo, minute et sparse punctato ; elytris fortiter sat sparse punctatis. Long. 5 mill. Afrique : San Thomé. — Plus brillant que le précédent avec le prothorax plus finement ponctué.

Xylographus bicolor n. sp. Nitidus, glaber, niger, thorace pedibusque pro parte rufescentibus, thorace antice sinuato. Long. 5 mill. Madagascar. — Voisin des précédents, coloration différente.

Xylographus brasiliensis n. sp. Nitidus, glaber, niger, tarsis rufescentibus ; thorace antice subarcuato, subalutaceo, fortiter et sparse punctato ; elytris fortiter et sparse punctatis. Long. 3 mill. Brésil : Rio-Verde. — Voisin de *X. corpulentus* Mel. avec une ponctuation plus forte et plus écartée.

Cis rufithorax n. sp. Robustus, nitidus, brevissime et irregulariter griseo pubescens, fortiter (1) sat dense

(1) Il s'agit surtout de la ponctuation du prothorax, celle des élytres étant souvent en partie effacée par des rides ou des granules ; parfois le fond est nettement alutacé, d'où le terme *diverse punctatus*.

punctatus, nigro-piceus, capite, thorace, antennis ad basin pedibusque rufescentibus ; ♂ thorace, antice, bidentato, capite antice emarginato et breve bidentato. Long. 3 mill. Madagascar : Annanarive (Sikora) (1). — Voisin de *C. quadricornis* Klug.

Cis punctatissimus n. sp. Robustus, parum nitidus brevissime et irregulariter griseo pubescens, sat fortiter et dense punctatus, niger, antennis brunnescentibus, thorace antice bidentato et capite lamellato et subdentato, ♀ capite breve lamellato. Long. 4-4,3 mill. — Voisin du précédent.

Cis subseriatus n. sp. Elongatus, subparallelus nitidus, fortiter sat dense punctatus, in elytris brevissime et subseriato pubescens, brunneus, antennis ad basin pedibusque rufescentibus, thorace et capite in mare inarmatis, sed capite antice breviter lamellato. Long, 3 mill. — Voisin de *C. interpunctatus* Mel.

Cis Sikorai n. sp. ♀ Oblongns, parum elongatus, nitidus, fortiter sat dcnse punctatus, irregulariter sat longe luteo pubescens, nigro-piceus, capite, antennis pedibusque rufescentibus ; capite antice breve inciso. Long. 2 mill. — Peut se placer près de *C. Guerini* Mel.

Cis madecassus n. sp. Satis robustus, nitidus, fortiter sat sparse punctatus, breve et irregulariter griseo aut fusco pubescens, brunnescens, pro parte piceus, antennis ad basin pedibusque pallidioribus ; ♂ thorace et capite antice breve emarginatis. Long. 2,5 mill. — Plus large que le précédent avec la pubescence plus courte, etc.

Cis delagoensis n. sp. Mediocre robustus, nitidus, fortiter sat dense punctatus, irregulariter luteo pubescens, brunnescens, antennis pedibusque rufescentibus ; thorace et capite in mare antice emarginato et breve bidentato. Long. 3 mill. Delagoa Bay. — Diffère du précédent par la forme moins trapue, la ponctuation plus dense du prothorax, etc.

(1) Les 4 espèces qui suivent me viennent de la même origine.

Cis Alluaudi n. sp. ♀ Mediocre robustus, nitidus, fortiter pro parte dense punctatus, luteo snbseriato pubescens, rufo-testaceus. Long. 3 mill. Assinie (Alluaud). — Très distinct du précédent par sa coloration, la pubescence plus régulièrement disposée et la ponctuation des élytres bien plus dense que celle du prothorax.

Cis madurensis n. sp. Satis robustus, subparallelus, nitidus, fortiter et dense punctatus, luteo aut fusco et parum regulariter pubescens, brunnescens, antennis pedibusque rufis : thorace et capite in mare antice excisis et breviter bidentatis. Long. 3 mill. Indes : Madura. — Peut se placer près de *C. seriatulus* Ksw.

Cis indicus n. sp. ♀ Oblongus, nitidus, fortiter sat sparse punctatus, luteo aut fusco breve et irregulariter pubescens, niger, elytris luteis, lateraliter infuscatis. Long. 3 mill. Indes : Mahé. — Distinct du précédent par sa coloration, la ponctuation plus écartée du prothorax, etc.

Dermestes elongatissimus n. sp. Valde elongatus, postice attenuatus, nitidus, subdepressus, brunnescens, luteo sat sparse pubescens, thorace fortiter sat sparse punctato, postice parum impresso. Long. 8 mill. Equateur. — Voisin de *D. angustus* Casey.

Attagenus nankineus n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, niger, antennis, apice brunnescentibus, pedibusque testaceis, luteo sat sparse pubescens ; antennis articulo ultimo elongato ; thorace lateraliter arcuato, mediocre et dense punctato ; scutello triangulare ; elytris apice mediocre attenuatis, sat sparse punctatis. Long. 4 mill. Chine : Nankin. — Voisin de *A. piceus* Ol.

Attagenus multinotatus n. sp. Oblongus, subnitidus, niger, elytris, antennis pedibusque rufescentibus, sat dense griseo aut luteo pubescens, elytris ad basin multi et minute brunneo maculatis, post basin brunneo notatis. Long. 4 mill. Indes orientales. — Voisin de *A. bifasciatus* Ol.

Attagenus (Telopes) Donckieri n. sp. Oblongus,

parum nitidus, niger, elytris postice rufescentibus, antennis pedibusque testaceis, griseo pubescens, thorace pro parte denudato, elytris ad medium parum distincte bifasciatis, antice et postice maculatis. Long. 3 mill. Afrique : Benguela. Acquis de Donckier. — Voisin de *T. scalaris* Pic.

Thaumaglossa pygidialis n. sp. Latus, subovatus, parum nitidus, niger, antennis pedibusque pro parte rufescentibus, capite, thorace pygidioque rufo-ochraceo pubescentibus, elytris parum distincte griseo trifasciatis. Long. 3 mill. Tonkin. — Voisin de *T. atricolor* Pic (décrit par erreur comme *Æthriostoma*.)

? Thaumaglossa (1) **tonkinea** n. sp. Latus, subovatus, nitidus, nigro-metallicus, griseo pubescens, thorace in disco, elytris ad et post medium apiceque denudatis pygidio rufo. Long. 3 mill. Tonkin. — Sans doute, voisin de *T. ovalis* Arrow, qui ne m'est connu que par la description.

Orphinus Guernei n. sp. Oblongo-ovatus, nitidus, minute et sparse punctatus, atro et fulvo pubescens, niger, antennis, tibiis tarsisque testaceis. Long. 2,5 mill. Ceylan : Kandy (J. de Guerne). — Peut se placer près de *O. funestus* Arrow.

Orphinus malabarensis n. sp. Subovatus, postice attenuatus, subnitidus, sat fortiter punctatus, atro et griseo pubescens, niger, antennis pedibusque testaceis. Long. 2 mill. Indes : Mahé. — Voisin du précédent.

Orphinus notaticollis n. sp. Subovatus, nitidus, atro et griseo pubescens, ater, thorace lateraliter, elytris (his ad basin nigro maculatis et ad medium nigro fasciatis), pygidio, antennis pedibusque rufescentibus. Long. 2,5 mill. Indes orientales. — Voisin de *O. nilgirensis* Arrow.

Orphinus atrofasciatus n. sp. Subovatus, nitidus, atro et griseo pubescens, rufo-testaceus, corpore infra ni-

(1) L'absence d'antennes chez le type, ne me permet pas de classer sûrement cette espèce dans ce genre.

gro, elytris ad basin nigro maculatis et ad medium transverse nigro fasciatis. Long. 3 mill. Indes : Madura. — Voisin du précédent.

Cryptorhopalum rufonotatum n. sp. Subovatus, satis convexus, postice attenuatus, luteo sat sparse pubescens, niger, elytris in disco late rufo notatis, antennis pedibusque rufescentibus. Long. 3 mill. Bolivie. — Voisin de *C. bimaculatum* Reitt.

Cryptorhopalum brunnescente n. sp. Subovatus, parum nitidus, rufo-brunneus, griseo-luteo pubescens, elytris ad basin et ad medium late luteo fasciatis, apice luteo maculatis. Long. 2,5 mill. Paraguey. — Peut se placer près de *C. instabile* Sharp.

Hemirhopalum longipenne n. sp. Elongatus, subparallelus, nitidus, brevissime et parum distincte pubescens, niger, antennis, tibiis anticis tarsisque rufescentibus. Long. 4,3 mill. Pérou : Rio Mixiollo (Baer). — Voisin de *H. clythræforme* Sharp.

Hemirhopalum rufipenne n. sp. Parum elongatus, subparallelus, nitidus, griseo sat sparse pubescens, niger, elytris, antennis pedibusque rufescentibus. Long. 3,5 mill. Mexique. — Voisin de *H. hadrotomoide* Sharp.

Trinodes carinatus n. sp. Subovatus, nitidus, griseo aut fulvo hispidus, niger, antennis pedibusque rufescentibus ; thorace lato, lateraliter postice fortiter carinato ; elytris mediocre et sparse punctatis. Long. 2 mill. Indes : Mahé. — Voisin de *T. minutus* Pic.

Scaphidium unifasciatum n. sp. Oblongus, nitidus, niger, pectore lateraliter luteo marginato, elytris nigris, antice rufo et sinuato fasciatis ; antennis satis gracilibus ; elytris minute et disperse punctatis. Long. 5 mill. Chine : Yunnan. —Très distinct par ses élytres unifasciés ; peut se placer près de *S. yunnanum* Frm.

Scaphidium longithorax n. sp. Oblongo-ovatus, ni-

tidus, rufo-testaceus, capite postice, thorace in disco et ad basin, clava antennarum, pygidio pectoreque nigris, elytris nigris, ad basin late apiceque minute testaceo maculatis. Long. 3 mill. Kina-Balu. — Voisin de *S. subelongatum* Pic, moins allongé et prothorax à bande noire longitudinale.

Scaphidium martapuranum n. sp. Oblongo-ovatus, nitidus, niger, capite antice, antennis ad basin tarsisque rufescentibus, elytris nigris, ad basin apiceque late et transverse rufo-testaceo maculatis. Long. 5 mill. — Voisin de *S. philippinense* Reitt. Bornéo

Cyparium punctatum n. sp. Subovatus, satis latus, nitidus, rufo-testaceus, thorace ad basin in medio irregulariter punctato ; elytris lineato punctatis, lateralibus distincte marginatis. Long. 3 mill. Ile Banguey. — Voisin de *C. piceum* Reitt., autrement ponctué.

Cyparium rufonotatum n. sp. Subovatus, nitidus, niger, thorace lateraliter, elytris in disco late femoribusque rufescentibus ; elytris mediocre lineato-punctatis. Long. 3 mill. Colombie. — Décrit sur un exemplaire défraichi et vieux, cependant bien distinct des autres espèces par les élytres largement roux sur le disque et bordés plus ou moins largement de noir. A placer près de *C. terminale* Mat.

Scaphosoma Raffrayi n. sp. Ovato-subquadratus, nitidus, sparse punctatus, niger, antennis, pedibus pygidioque testaceis, elytris rufo-testaceis, in disco et ad suturam antice late nigro-piceo notatis. Long. 2,5 mill. Abyssinie (Raffray). — Voisin de *S. apicerubrum* R. Ob.

Scaphosoma ruficeps n. sp. Oblongo-ovatus, nitidus, elytris fortiter et sparse punctatis, rufo-testaceis, thorace in disco postice brunnescente, pectore pygidioque supra nigris, elytris nigro-piceis, apice late rufo-testaceis. Long. 2,5 mill. Madagascar. — Plus allongé que le précédent, plus fortement ponctué sur les élytres avec une autre coloration.

Scaphosoma pygidiale n. sp. Ovato-elongatus, nitidus, elytris minute et sparse punctatis, stria sutnralis reducta, niger, pygidio, antennis pedibusque rufescentibus. Long. 2,5-2,8 mill. Indes : Madura. — Peut se placer près de *S. hæmorrhoidale* Reitt.

Scaphosoma brunneipenne n. sp. Subovatus, nitidus, elytris sat fortiter et sparse punctatis, stria suturalis ad basin prolongata, nigro-piceus, elytris, pectore capiteque antice brunnescentibus, antennis, pedibus abdominequc rufescentibus. Long. 2 mill. Brésil. — A placer près de *S. punctatissimum* Math.

Bæocera ruficolor n. sp. Subovatus, latus, nitidus, rufus, capite antice, antennis, pedibus abdomineque pallidioribus ; elytris minute et sparse punctatis, stria saturalis ad basin prolongata. Long. 2 mill. Bornéo : Martapura. — Voisin de *B. malaccana* Pic, forme plus élargie et strie suturale prolongée sur la base de chaque élytre.

Bæocera curtipenne n. sp. Subovatus, postice attenuatus, minute et sparse punctatus, nigro-piceus, capite antice, antennis, pedibus pygidioque testaceis. Long 2 mill. Malacca : Perak. — Plus foncé et plus atténué postérieurement que le précédent.

Bæocera argentinum n. sp. Subovatus, postice attenuatus, fere indistincte punctatus, niger, elytris apice late rufis, capite, antennis, pedibus, pygidioque testaceis. Long. 2 mill. Rép. Argentine. — Voisin du précédent dont il diffère, en plus de sa coloration, par la strie suturale plus profonde et les élytres indistinctement ponctués.

Eunearthron argentinum n. sp. Oblongus, nitidus, diverse et fortiter punctatus, breve et irregulariter griseo pubescens, rufo-brunnescens, antennis pedibusque pallidioribus ; thorace capiteque in mare breve bicornutis. Long. 2,5 mill. République Argentine. — Peut se placer près de *E. multipunctatum* Mel.

Eunearthron simplicicorne n. sp. ♂, Oblongo-

elongatus, nitidus, diverse et minute punctatus, glaber, nigro-piceus, capite thoraceque antice rufescentibus, antennis ad basin pedibusque testaceis ; capite lamina, apice truncata, munito. Long. 2,3 mill. Buenos-Ayres. — Voisin de *E. hartiferum* Mel., coloration différente et lame de la tête non pointue au sommet.

Eunearthron bilamellatum n. sp. ♂. Oblongo, elongatus, nitidus, fere glaber, diverse et minute punctatus, nigro-piceus, antennis ad basin pedibusque testaceis ; thorace antice et capite lamellatis. Long. 2,5 mill. Madagascar. — Voisin de *C. cucullatum* Mel., avec la lamelle du prothorax plus petite.

Ceracis ruficorne n. sp. ♂. Oblongus, nitidus, glaber, minute et sparse punctatus, niger, antennis ad basin pedibusque testaceis ; thorace antice bituberculato ; capite lamina rufa, apice truncata, munito. Long. 2 mill. Brésil. — A placer près de *C. unicornis* Gorh.

Calochromus thibetanus n. sp. Satis elongatus, parum nitidus, niger, thorace postice et lateraliter testaceo limbato, illo sparse fulvo pubescente, elytris nigris, ad suturam anguste, lateraliter apiceque sat late, rufo limbatis. Long. 10 mill. Thibet. — Cette espèce, très distincte par sa coloration, peut se placer près de *C. apicalis* Wat.

Calochromus tonkineus n. sp. Elongatus, subparallelus, nitidus, niger, elytris purpureis ; thorace breve, antice attenuato, sulcato, lateraliter mediocre impresso ; elytris multi costulatis. Long. 7 mill. Tonkin. — A placer près de *C. madurensis* Pic, en diffère notamment par le prothorax nettement rétréci en avant.

Calochromus costatipennis n sp. Elongatus, subparallelus, parum nitidus, niger, thorace purpureo et pro parte testaceo limbato, elytris purpureis, apice sat late nigris ; thorace subquadrato, sulcato ; elytris sat fortiter costatis. Long. 9-10 mill. Sumatra. — Peut se placer près de *C. sumatrensis* Bourg.

TABLE

POUR LE DIX-SEPTIÈME FASCICULE

	Pages
Introduction.	1
Notes et descriptions abrégées diverses.	2
Diagnoses spécifiques.	8